CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON TUMORES DE AMPOLLA DE VATER EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

Jeisson Andrey Toro Santibáñez, Lidia Hervés González, Claudia Pérez Urra, Mónica Bru Arca, Aurelio Ángel Romero Pérez, Blanca Serra Cobo, Yerko Escobar Melendres, Melania Ruth Gonzalvez Travieso

Complejo Asistencial Universitario de Palencia

OBJETIVOS:

Los tumores de la ampolla de Vater representan el 2% de los tumores digestivos; siendo el adenoma el tumor más frecuente. Su pronóstico es mejor que el del resto de tumores del árbol biliar debido a que su localización produce ictericia obstructiva de manera precoz.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Realizamos un estudio observacional, descriptivo retrospectivo de los pacientes ingresados con diagnóstico de ampuloma en un hospital de segundo nivel entre enero de 2019 y diciembre de 2023.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Se obtuvieron 27 pacientes, 59,1% fueron varones. La edad media fue 72,48 años (DE: 11,78. El 74,1% de los pacientes presentaban colelitiasis. La forma de presentación más frecuente fue la ictericia (66,67%), el 11,1% estaban asintomáticos al diagnóstico. La ecoendoscopia fue la prueba diagnóstica más empleada (44,5%), seguida de la CPRE (37%). La histología más frecuente fue la de adenocarcinoma (81,5%) seguida del adenoma con displasia de bajo grado (11,1%). Los tratamientos más empleados fueron la cirugía de Whipple y el tratamiento paliativo (48,1% cada uno). La mortalidad se asocia de manera estadísticamente significativa con el tratamiento empleado ($p=0,004$). El 81,5% de los pacientes precisó en el curso de la enfermedad drenaje biliar mediante CPRE. La mortalidad total fue del 63%; de los 13 pacientes que se operaron el 30,7% falleció en el postoperatorio inmediato. La mortalidad se correlaciona de manera directa y estadísticamente significativa con la edad ($p<0,001$).

CONCLUSIONES:

El síntoma más frecuente en nuestra serie fue la ictericia obstructiva.
Las pruebas endoscópicas son el método diagnóstico más empleado con la ecoendoscopia a la cabeza.
En cuanto al tratamiento la CPRE es fundamental para el drenaje biliar y la cirugía de Whipple sigue siendo la elección en pacientes potencialmente tratables.
Los tumores de la ampolla de Vater presentan una elevada mortalidad que se correlaciona de manera estadísticamente significativa con la edad.